

★当日、処方(診察)を希望しますか?(どちらかに○を)
希望しない · 希望する→別紙【診察処方希望用紙】にも記入してください

インフルエンザHAワクチン予防接種(1回目・2回目) 予診票

任意接種用

住 所	来院時の体温		度 分		
	TEL ()	-	(続柄)	生年月日	平成 年 月 日 生 令和 (歳 カ月)
(フリガナ) 予防接種を受ける人の氏名	男・女				
保 護 者 の 氏 名					

質 問 事 項	回 答 欄		医師記入欄
1. 今日受ける予防接種について説明文を読んで理解しましたか	いいえ	はい	
2. 1週間以内に、普段と違って具合の悪いところや熱はありましたか	ある (具体的に)	ない	
3. 現在、何かの病気で医師にかかりていますか その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてもよいと言われましたか	はい(病名)	いいえ	
4. 最近1カ月以内に何か病気にかかりましたか	いいえ	はい	
5. 1カ月以内に予防接種を受けましたか 予防接種の種類() 接種月日(月 日)	はい	いいえ	
6. 今までに特別な病気(先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、血液疾患、脳神経、喘息、免疫不全症、悪性腫瘍、その他の病気)にかかり、医師の診断を受けたことがありますか 【ある】その病気を診てもらっている医師に、今日の予防接種を受けて良いといわれましたか	はい(病名)	ない	
7. 今までにけいれん(ひきつけ)を起こしたことがありますか 【ある】けいれん(ひきつけ)を起こしたとき、熱は出ましたか	いいえ	はい (°C)	いいえ
8. 【予防接種を受けられる方がお子さんの場合】 分娩時、出生時、乳幼児健診などで異常がありましたか	ある (具体的に)	ない	
9. 今までにインフルエンザの予防接種を受け具合が悪くなつたことはありますか	ある (年 月ごろ)	ない	
10. インフルエンザ以外の予防接種の際に具合が悪くなつたことがありますか	ある (予防接種名)	ない	
11. 薬や食品(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹や蕁麻疹が出たり、体の具合が悪くなつたことがありますか	ある (薬、食品名)	ない	
12. 近親者の中に予防接種を受けて、具合が悪くなつた方はいますか	いる (予防接種名)	いない	
13. 近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか	いる	いない	
14. 1カ月以内に家族や周囲で麻疹、風疹、水痘、おたふくかぜなどにかかった方がいますか	いる	いない	
15. 1カ月以内に新型コロナウイルス感染症の陽性になりましたか	はい (待機期間 / ~ /)	いいえ	
16. その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことがあればご記入ください			

医師記入欄

以上の問診および診察の結果、今日の予防接種は(実施できる・見合わせたほうがよい)と判断します。接種を受ける本人(またはその保護者)に対して、予防接種の効果、副反応および医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について説明しました。
医師の署名 [中川 真哉]

本人(またはその保護者)記入欄

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解したうえで接種することに(同意します · 同意しません)。

署名(同伴者名)

(続柄:)

医師記入欄

使用ワクチン名・メーカー名	接種量	実施場所・医師名・接種年月日	
インフルエンザHAワクチン	Lot No.	皮下接種 <input checked="" type="checkbox"/> 0.5mL (3歳以上) <input checked="" type="checkbox"/> 0.25mL (6カ月以上3歳未満)	医療機関名: すこやかkidsクリニック 医師名: 中川 真哉 接種年月日: 年 月 日 時

記載いただきました個人情報は、まちのほけんしつで適切に管理します。

インフルエンザHAワクチンの接種について

任意接種用

インフルエンザHAワクチンの接種に当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、表面の予診票にできるだけ詳しくご記入ください。ワクチン接種を受けられる方が子どもさんの場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入ください。

ワクチンの効果と副反応

インフルエンザHAワクチンの接種により、インフルエンザを予防したり、症状を軽くすることが期待されます。また、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれる、小水疱などがみられることがあります、数日以内に自然に消失します。また、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、咳、嘔吐・嘔氣、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、筋力低下などが起こることがあります。過敏反応として、発疹、蕁麻疹、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管浮腫などが起こることもあります。その他に蜂巣炎、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神、血管迷走神経反応、ブドウ膜炎、振戦が現れることがあります。強い卵アレルギーなどのある方は強い過敏反応を生じる可能性がありますので、接種前に必ず医師に申し出てください。重大な副反応としては、次のような副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー(蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)脳炎・脳症、脊髄炎、視神經炎、(4)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(5)けいれん(熱性けいれん含む)、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(9)血管炎(IgA血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破碎性血管炎など)、(10)間質性肺炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、急性汎発性発疹性膿疱症、(12)ネフローゼ症候群など。その他にも不明・不安な症状が現れたり、これらの疾患が疑われるような場合には、接種医又はお近くの医療機関にご相談ください。

予防接種を受けることができない人

- 明らかに発熱のある人(37.5°C以上の人)
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- 過去にインフルエンザHAワクチンの接種を受けて、アナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難、全身性の蕁麻疹などを伴う重症のアレルギー反応)を起こしたことがある人
なお、他の医薬品投与を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を仰いでください。
- その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人

- 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
- 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
- 過去に予防接種を受けた時に、2日以内に発熱、発疹、蕁麻疹などのアレルギーを疑う異常がみられた人
- 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 過去に免疫不全の診断がなされている人及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
- 妊娠の可能性がある人
- 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器疾患のある人

予防接種を受けた後の注意

- インフルエンザHAワクチンの接種を受けたあと30分間は、急な副反応(息苦しさ、蕁麻疹、咳など)が起きことがあります。医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
- 接種当日は、接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
- 万一、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

接種予定日	月	日()	医療機関名
当日は受付に	時	分頃 おこしください	

インフルエンザHAワクチンの任意の接種については、ワクチンを適正に使用したにもかかわらず、その副反応により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合は、健康被害を受けた人又は家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて、救済手続きを行う制度があります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。問合せ先は右記のとおりです。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
電話 : 0120-149-931(フリーダイヤル)
URL : <https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0020.html>